



Basiscursus Biologisch Tuinieren in de moestuin Teelttechnieken, deel 3#4

met Herman De Waele

In deze les worden de voornaamste teelttechnieken en werkzaamheden toegelicht aan de hand van veel foto- en filmmateriaal

1. Voorkiemen

Zodra wij de pootaardappelen ontvangen hebben, geven wij ze een warmtestoot om het kiemproces te starten. Als wij de kiempjes zien plaatsen wij de kistjes koel en klaar (op terras maar vorstvrij)



De kiemscheutjes verschijnen, nu koel zetten in volle licht

2. Voorkweken

Wij zaaien in zaai- en stekgrond
Wij verspenen of verpotten in potgrond



Zaaien

- Vanaf half februari
- We zaaien binnen in een bakje
- Afdekken met pvc-zakje
- Na de kieming zakje open zetten
- Warmteminnend: Paprika, tomaat, aubergine (20 – 25 °C)



- Normale warmtebehoefte: Sla, knolselder, peterselie, bleekselder, ajuin, zomerprei (kamertemperatuur)

Verspenen

Wij verspenen bij het verschijnen van de echte blaadjes of als de echte blaadjes gevormd zijn



Na de 2 zaadlobben verschijnen de echte blaadjes

- Verspenen in opgewarmde potgrond
- **Koeler en Klaar**

zetten

3. Bodembewerking

Wij verluchten de bodem met een woelvork of spitvork. De bodem mag niet te nat noch te koud zijn. Deze bewerking is rugsparend en gaat sneller dan spitten. Het kruid moet wel vooraf afgevoerd worden naar de compostplaats. Achteraf gaan we de teeltbedden niet meer betreden. We werken eventueel op planken.

4. Compost voeren

Wij zien op welke wijze de compost gemakkelijk uitgevoerd wordt. Wij voeren hem uitsluitend naar de percelen met de veeleisende blad- en vruchtgewassen. Wij werken de compost oppervlakkig in met een mesthaak.

5. Zaaien in volle grond

Vanaf maart tot september. De grond is fijn gelegd met mesthaak en hark.

- Wij werken dwars op de breedte
- Wij maken een zaaivoortje van +/- 1 cm diep.
- Meestal is de rijafstand 25 à 30 cm
- Niet te dik zaaien
- Zaad aandrukken met hark
- Gieten bij droogte
- Na opkomst dunnen

6. Planten in volle grond



Zelfgekweekte of gekochte plantjes worden uitgeplant op een onkruidvrij bed en aanstands voorzien van een bodembedekking tussen de rijtjes. Goed water geven.

7. Wieden en water geven waar nodig

8. Anti-insectengas plaatsen

Ajuin – prei: Wij gebruiken anti-insecten gaas van 3,2 m breed met een maaswijdte van 0,8 mm boven prei en ajuin (preimot, ajuinvlieg, mineervlieg)

Wortelen: Maaswijdte 0.8 à 1 mm (wortelvlieg)



Kolen: Maaswijdte 0.8 à 1 mm



9. Nateelten zaaien en planten

Na de erwten en vroege aardappels kan men nog een nateelt zaaien of planten. Zoals: prei, spinazie, andijvie, suikerbrood, venkel, (aardbei? moet blijven staan!)

10. Augustuszaai

In augustus kunnen wij nog veldsla, winterpostelein en lepelblad zaaien. Wij zaaien ze voordelig in een zaaiplaat met bvb. Vakjes van 5 cm. Er mogen meerdere zaaadjes per vakje vallen. Wij planten later uit op 20 x 20 cm.



11. Winterzorgen

Door percelen op winterbedden te leggen zorgen wij voor onkruidbestrijding en snelle ontwatering in de lente.



In variante kunnen wij percelen afdekken met antiworteldoek om ze onkruidvrij te krijgen tegen de lente